

Düzlemin İzometriteri

TASLAK

David Pierce

10 Mayıs 2016

Matematik Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

İstanbul

dpierce@msgsu.edu.tr

<http://mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/>

V, \mathbb{R}^n gerçel iççarpım uzayı olsun. V 'nin bir **izometri**, uzunlukları koruyan bir eşleşmedir.

$$\text{Isom}(V) = \{V\text{'nin izometriteri}\},$$

$$\text{GL}(V) = \{V\text{'nin lineer eşleşmeleri}\},$$

$$\text{O}(V) = \text{Isom}(V) \cap \text{GL}(V)$$

olsun. Bunlar, bileşke alma altında *grupturlar*.

Teorem 1. $\text{O}(V) = \{g \in \text{Isom}(V) : g(\mathbf{0}) = \mathbf{0}\}.$

Kanıt. $\text{Isom}(V)$ grubunun her g elemanı, köşeleri $\mathbf{0}$, \mathbf{a} , \mathbf{b} , ve $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ olan her paralelkenarının kenarlarının ve köşegenlerinin uzunluklarını korur. Özel olarak $g(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ ise

$$g(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = g(\mathbf{a}) + g(\mathbf{b}). \quad \square$$

$A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ ise

$$T_A: V \rightarrow V, \quad T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

olsun. Burada

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1 \ \cdots \ x_n)^t.$$

Teorem 2. $\text{GL}(V) = \{T_X: \det(X) \neq 0\}$,
 $\text{O}(V) = \{T_X: X^t X = I_n\}$.

Eğer $\mathbf{a} \in V$ ise

$$t_{\mathbf{a}}: V \rightarrow V, \quad t_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}) = \mathbf{a} + \mathbf{x}$$

olsun, ve

$$T(V) = \{t_{\mathbf{x}}: \mathbf{x} \in V\}$$

olsun. Burada $t_{\mathbf{a}}$, \mathbf{a} ile **ötelemedir**. O zaman

$$T(V) < \text{Isom}(V), \\ \mathbf{x} \mapsto t_{\mathbf{x}}: V \xrightarrow{\cong} T(V).$$

Teorem 3. $T(V) \times \text{O}(V) \approx \text{Isom}(V)$, yani bu iki küme eşleniktir. Aslında

$$(t_{\mathbf{x}}, \xi) \mapsto t_{\mathbf{x}} \circ \xi,$$

bir eşlemedir.

Kanıt. Verilen gönderme, birebirdir (**alıştırma**). Göndermenin tersi,

$$\xi \mapsto (t_{\xi(\mathbf{0})}, t_{-\xi(\mathbf{0})} \circ \xi)$$

çünkü $\alpha \in \text{Isom}(V)$ ve $\beta = t_{-\alpha(\mathbf{0})} \circ \alpha$ ise $\beta(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, dolayısıyla $\beta \in \text{O}(V)$; ve $\alpha = t_{\alpha(\mathbf{0})} \circ \beta$. \square

Bir G grubunun H ve K altgrupları için

$$G = HK, \quad H \cap K = \{e\},$$

olsun. Bu şekilde $(x, y) \mapsto xy: H \times K \xrightarrow{\sim} G$. Eğer

$$H \triangleleft G$$

ise, o zaman

$$G = H \rtimes K$$

yazarız, ve bu durumda $h_i \in H, k_i \in K$ ise

$$h_1 k_1 \cdot h_2 k_2 = h_1 (k_1 h_2 k_1^{-1}) \cdot k_1 k_2, \quad k_1 h_2 k_1^{-1} \in H.$$

$G = HK$ durumunda $H \triangleleft G$ göstermek için, $k \in K$ olduğunda $kHk^{-1} = H$ göstermek yeter.

Teorem 4. $\text{Isom}(V) = \text{T}(V) \rtimes \text{O}(V)$.

Kanıt. $\text{T}(V) \triangleleft \text{Isom}(V)$ göstermek yeter. Eğer $\mathbf{a} \in V$ ve $\alpha \in \text{O}(V)$ ise, o zaman

$$\alpha \circ t_{\mathbf{a}} \circ \alpha^{-1} = t_{\alpha(\mathbf{a})},$$

çünkü α lineer olduğundan

$$\alpha \circ t_{\mathbf{a}} \circ \alpha^{-1}(\mathbf{x}) = \alpha(\mathbf{a} + \alpha^{-1}(\mathbf{x})) = \alpha(\mathbf{a}) + \mathbf{x} = t_{\alpha(\mathbf{a})}(\mathbf{x}). \quad \square$$

Şonuc olarak $\text{Isom}(V) \cong V \rtimes \text{O}(V)$. Özel olarak

$$\text{Isom}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R} \rtimes \mathbb{Z}_2$$

çünkü $\text{O}(\mathbb{R}) \cong \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 1\} = \{\pm 1\}$.

Genelde

$$\text{SO}(V) = \{T_X : \det X = 1\},$$

$$\text{O}(V) = \{T_X : \det X = \pm 1\}.$$

Şimdi $n = 2$ olsun. Bu durumda $V = \mathbb{R}^2$ ve

$$\text{SO}(V) = \{\mathbf{0} \text{ etrafında döndürmeler}\},$$

$$\text{O}(V) \setminus \text{SO}(V) = \{\mathbf{0}'\text{dan geçen doğrular etrafından yansımalar}\}.$$

Aslında

$$\text{O}(V) = \left\{ T_X : X = \begin{pmatrix} \cos \theta & \mp \sin \theta \\ \sin \theta & \pm \cos \theta \end{pmatrix} \wedge 0 \leq \theta < 2\pi \right\},$$

$$\text{SO}(V) = \left\{ T_X : X = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \wedge 0 \leq \theta < 2\pi \right\}.$$

Kısaltma olarak

$$\rho_\theta = T \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad r_0 = T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

olsun. $V = \mathbb{C}$ düşünülebilir, ve bu şekilde

$$\rho_\theta(z) = e^{i\theta} \cdot z, \quad r_0(z) = \bar{z}.$$

Teorem 5. $\text{O}(V) = \text{SO}(V) \rtimes \langle r_0 \rangle$.

Kanıt. $r_0^{-1} = r_0$ ve $r_0 \circ \rho_\theta \circ r_0 = \rho_{-\theta}$. (Bu eşitlikler, ya matrisler ya da karmaşık sayılar ile doğrulanabilir.) \square

Şimdi

$$\text{Isom}(V) = T(V) \rtimes (\text{SO}(V) \rtimes \langle r_0 \rangle).$$

Özel olarak $\text{Isom}(V)$ grubunun her α elemanı için, V 'nin bir ve tek bir \mathbf{a} elemanı için, bir ve tek bir θ açısı için

$$\alpha \in \{t_{\mathbf{a}} \circ \rho_{\theta}, t_{\mathbf{a}} \circ \rho_{\theta} \circ r_0\}.$$

Ama başka bir biçimde α daha iyi anlaşılabilir.

Tekrar $\mathbf{a} \in V$ ve $\rho_{\theta} \in \text{SO}(V)$ olsun. Burada

$$t_{\mathbf{a}}^{-1} = t_{-\mathbf{a}}, \quad \rho_{\theta}^{-1}(\mathbf{x}) = \rho_{-\theta}(\mathbf{x}).$$

O zaman

- $t_{\mathbf{a}}$, \mathbf{a} ile **ötelemedir**;
- ρ_{θ} , $\mathbf{0}$ noktası etrafında θ açısından **döndürmedir**;
- r_0 , $\{t(1, 0) : t \in \mathbb{R}\}$ doğrusu etrafında **yansımadır**;
- $t_{\mathbf{a}} \circ \rho_{\theta} \circ t_{-\mathbf{a}}$, \mathbf{a} noktası etrafında θ açısından **döndürmedir**;
- $\rho_{\theta} \circ r_0 \circ \rho_{-\theta}$, $\{t(\cos \theta, \sin \theta) : t \in \mathbb{R}\}$ doğrusu etrafında **yansımadır**;
- $t_{\mathbf{a}} \circ \rho_{\theta} \circ r_0 \circ \rho_{-\theta} \circ t_{-\mathbf{a}}$, $\{\mathbf{a} + t(\cos \theta, \sin \theta) : t \in \mathbb{R}\}$ doğrusu etrafında **yansımadır**;
- $b \in \mathbb{R}$ ise $t_{b(\cos \theta, \sin \theta)} \circ t_{\mathbf{a}} \circ \rho_{\theta} \circ r_0 \circ \rho_{-\theta} \circ t_{-\mathbf{a}}$, $b(\cos \theta, \sin \theta)$ ile $\{\mathbf{a} + t(\cos \theta, \sin \theta) : t \in \mathbb{R}\}$ doğrusu etrafında **kaydırma yansımasıdır**.

Lemma. Her θ açısı ve a karmaşık sayısı için

$$r_0 \circ \rho_\theta = \rho_{-\theta} \circ r_0,$$

$$r_0 \circ t_a = t_{\bar{a}} \circ r_0,$$

$$\rho_\theta \circ t_a = t_{ae^{i\theta}} \circ \rho_\theta.$$

Teorem 6. $\text{Isom}(\mathbb{R}^2)$ grubunun aşikâr olmayan her elemanı, ya öteleme, ya döndürme, ya yansıma, ya da kaydırma yansımasıdır.

Kanıt. Gördüğümüz gibi $\text{Isom}(\mathbb{C})$ grubunun her α elemanı için, \mathbb{C} 'nin bir a elemanı için, bir θ açısı için ya $\alpha = t_a \circ \rho_\theta$, ya da $\alpha = t_a \circ \rho_\theta \circ r_0$.

Genelde \mathbb{C} 'nin her b elemanı için

$$\begin{aligned} t_a \circ \rho_\theta &= t_b \circ \rho_\theta \circ t_{-b} \iff t_{a-b} \circ \rho_\theta = \rho_\theta \circ t_{-b}, \\ a - b &= -be^{i\theta} \iff a = b(1 - e^{i\theta}). \end{aligned}$$

O zaman $\theta \neq 0$ ise lemmaya göre

$$t_a \circ \rho_\theta = t_{a/(1-e^{i\theta})} \circ \rho_\theta \circ t_{-a/(1-e^{i\theta})};$$

özel olarak $t_a \circ \rho_\theta$, bir döndürmedir.

Lemmaya göre de

$$\rho_\theta \circ r_0 = \rho_{\theta/2} \circ r_0 \circ \rho_{-\theta/2},$$

ve bu bir yansımadır. Genelde

$$r_\theta = \rho_\theta \circ r_0 \circ \rho_{-\theta}$$

olsun. O zaman bir kaydırma yansımasını

$$t_{re^{i\theta}} \circ t_a \circ r_\theta \circ t_{-a}$$

biçiminde yazabiliriz. Lemmanın ikinci eşitliğini

$$r_0 \circ t_a = t_{r_0(a)} \circ r_0$$

biçiminde yazabiliriz, ve benzer şekilde

$$r_\theta \circ t_a = t_{r_\theta(a)} \circ r_0.$$

Şimdi φ açısı ve \mathbb{C} 'nin a elemanı verilirse

$$b = \frac{a + r_\varphi(a)}{2}, \quad c = \frac{a - r_\varphi(a)}{4}$$

olsun. O zaman $b = |b| \cdot e^{i\varphi}$ ve

$$t_b \circ t_c \circ r_\varphi \circ t_{-c} = t_{b+c+r_\varphi(-c)} \circ r_\varphi = t_a \circ \rho_{2\varphi} \circ r_0.$$

Burada $2\varphi = \theta$ olabildiğinde $t_a \circ \rho_\theta \circ r_0$ izometrisi, $b = 0$ durumunda yansımadır, diğer durumlarda kaydırma yansımasıdır. \square