

Bağıntılar

Öklid Geometrisine Giriş

5 Kasım 2018

1 Analiz

Gerçel sayılar için, işareti $>$ olan **daha büyük olma** bağıntısı sık sık kullanılıyor. İsimli iki özelliği vardır. Daha büyük olma bağıntısı:

- **geçişlidir**, çünkü a, b , ve c gerçel sayı olmak üzere

$$a > b \ \& \ b > c \ \text{ise} \ a > c;$$

- **yansımazdır**, çünkü a gerçel sayı olmak üzere

$$a > a \ \text{değildir.}$$

Kısaca gerçel sayılarda

$$\forall x \forall y \forall z (x > y \wedge y > z \Rightarrow x > z), \quad \forall x x \not> x.$$

İşareti $<$ olan **daha küçük olma** bağıntısının aynı özelliği vardır:

$$\forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \Rightarrow x < z), \quad \forall x x \not< x.$$

Bu iki bağıntının her biri, diğerinin **tersidir**:

$$\forall x \forall y (x < y \Leftrightarrow y > x).$$

Tersi aynı olan bir bağıntı, **simetriktir**. Örneğin eşitlik, simetriktir.

İki bağıntı daha türetilir:

$$\forall x \forall y ((x \geq y \Leftrightarrow x > y \vee x = y) \wedge (x \leq y \Leftrightarrow x < y \vee x = y)).$$

Daha büyük veya eşit olma bağıntısı:

- geçişlidir;
- **yansımalıdır**, çünkü $\forall x x \geq x$;
- **ters simetrilidir**, çünkü

$$\forall x \forall y (x \geq y \wedge y \geq x \Rightarrow x = y).$$

Bundan dolayı, daha büyük veya eşit olma, bir **sıralamadır**. Bu sıralama **doğrusaldır**, çünkü

$$\forall x \forall y (x \geq y \vee y \geq x).$$

Geçişli ve yansımaz olduğundan daha büyük olma, bir **kesin sıralamadır**. Ayrıca kesin **doğrusal** bir sıralamadır, çünkü

$$\forall x \forall y (x > y \vee x = y \vee y > x).$$

2 Sayılar Kuramı

Eğer tamsayılarda a kere b , c ederse, o zaman

$$a, c'yi \text{ böler}; \quad b, c'yi \text{ ölçer}.$$

Öklid'in VII. kitabının 16. önermesinin sayesinde çarpma işlemi değişmelidir, dolayısıyla bölme bağıntısı, ölçme bağıntısı ile aynıdır. Bu bağıntının işareti | olduğundan

$$\forall x \forall y (x | y \Leftrightarrow \exists z xz = y).$$

Bölme bağıntısı, hem yansımali hem de geçişlidir.

Sayma sayılarında bölme, ters simetrilidir, dolayısıyla bir sıralamadır. Bu sıralama doğrusal değildir, **parçalıdır**.

Tamsayılarda, Gauss'un 1801 yılında verdiği tanıma göre, eğer bir a sayısı, b ve c 'nin farkını ölçerse, o zaman b ve c , **a modülüne göre çakışır**, ve

$$b \equiv c \pmod{a}$$

yazılır. Gauss'un Latince'sinde modül, *modulus*'tur; *modulus*, küçük bir *modus*'tur; *modus*, bir ölçüdür. Kısaca modül, bir ölçücüdür. Bugün, verilen bir modüle göre çakışık sayılara **kalandaş** denebilir.

Her n sayma sayısı için, n modülüne göre kalandaşlık bağıntısı • yansımaldır, • simetriktir, • geçişlidir. Sonuç olarak, tanıma göre, verilen bir modüle göre kalandaşlık, bir **denklik bağıntısıdır**.

Öklid'in *Öğeler*'inin VII. kitabının başlangıcında bulunan *Öklid Algoritması* ile iki sayma sayısının en büyük ortak böleni elde edilebilir. Şimdi

$$\text{ebob}(a, b) = c, \quad \text{ebob}(d, e) = f$$

olsun. Eğer

$$a = cx \wedge b = cy \wedge d = fx \wedge e = fy$$

sistemi çözülebilirse, o zaman

$$(a, b) \sim (d, e)$$

yazılsın. Buradaki \sim bağıntısı, bir denklik bağıntısıdır. Bir teoreme göre

$$\forall x \forall y \forall z \forall w ((x, y) \sim (z, w) \Leftrightarrow xw = yz).$$

Teoremi kanıtlamak, okura bırakılıyor.

3 Geometri

Analizde ve sayılar kuramında çok ifadeler, *sayı* olarak düşünülür. İki ifadenin sayısal değeri aynı ise, ifadeler **eşittir**. Yukarıda eşitliğin kavramını ve $=$ işaretini zaten kullandık. Örneğin ifade olarak $1 + 2$ ve 3 farklıdır, ama değeri aynıdır, dolayısıyla $1 + 2 = 3$.

Öklid geometrisinde açılar ve sınırlanmış doğrular ve alanlar vardır, ama hiçbirinin sayısal değeri yoktur. Öklid'in "ortak kavramlarına" göre

- birbiriyle çakışan veya örtüşen, veya birbirine uygulayan, şeyler eşittir;

- eşitlik, bir denklik bağıntısıdır.

Örneğin Önerme 4'e göre iki üçgende iki kenar, iki kenara eşit ise, ve içeren açılar da eşit ise, o zaman üçgenler de eşittir, çünkü çakışırdır. Önerme 35'te çakışmayan ama *parçaları* çakışan paralelkenarlar eşittir.

4 Kümeler Kuramı

İki kümenin elemanları aynı ise, kümeler **eşittir**.

Verilen bir A kümesinde bir B **bağıntısı**, $A \times A$ veya A^2 çarpımının bir altkümesidir. Örneğin \mathbb{R} gerçel sayılar kümesinde, eğer pozitif sayılar, P kümesini oluşturursa, o zaman daha büyük olma bağıntısı,

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y \in P\}$$

kümesidir. Ayrıca \mathbb{Z} tamsayılar kümesinde bir n modülüne göre kalandaşlık

$$\{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : n \mid x - y\}$$

kümesidir.

Bir A kümesinde D , bir denklik bağıntısı olsun. Eğer $b \in A$ ise, o zaman tanıma göre b 'nin **denklik sınıfı** veya D **sınıfı**,

$$\{x \in A : x D b\}$$

kümesidir. Bu sınıf, $[b]$ veya \bar{b} veya b/D olarak yazılabilir.

Bir özel durumda, başka bir ifade vardır. Eğer \sim bağıntısı yukarıdaki gibi tanımlanır, o zaman a ve b sayma sayısı olmak üzere (a, b) sıralı ikilisinin \sim sınıfı, $\frac{a}{b}$ veya a/b **kesirli sayısı** olarak anlaşılabılır.

Genelde

$$[b] \cap [c] \neq \emptyset \Rightarrow [b] = [c].$$

Bu sonuca bir kanıt bulmak, okura bırakılıyor.